

FÍSTULA GASTRO-GÁSTRICA PÓS-CIRURGIA DE FOBI-CAPELLA PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA

ELIAS JIRJOSS ILIAS¹, PAULO KASSAB¹, OSVALDO ANTONIO PRADO CASTRO¹, MARCOS ANTONIO COSTACURTA², CARLOS ALBERTO MALHEIROS³

Paciente feminina, 54 anos, IMC de 37, tendo como comorbidades diabetes e esteatose hepática. Foi submetida à cirurgia de gastroplastia com derivação em Y de Roux por via laparotômica. Teve alta sem intercorrências no quarto dia de pós-operatório. Durante o acompanhamento ambulatorial apresentou dor intensa epigástrica com vômitos no oitavo mês de pós-operatório. Foi realizada endoscopia digestiva alta que mostrou úlcera jejunal em boca anastomótica e fístula gastro-gástrica entre a pequena e a grande câmara gástrica de aproximadamente 1 cm de diâmetro. O raio X contrastado (Figura) de esôfago, estômago e jejuno demonstrou a presença de fístula entre as duas câmaras gástricas com o contraste realçando a grande câmara e o duodeno que deveriam estar excluídos do trânsito.

DISCUSSÃO

A fístula gastro-gástrica é de ocorrência rara e geralmente ocorre devido à presença de úlcera gástrica na pequena câmara com erosão para a grande câmara. A oclusão da fístula pode ser realizada com o

tratamento clínico da úlcera e em caso de insucesso deve-se indicar o fechamento cirúrgico por grampeamento desse pertuito que pode ser tanto por via videolaparoscópica quanto pela via laparotômica. A literatura também cita o uso de cola biológica por via endoscópica na oclusão de fístulas com pequeno diâmetro.

REFERÊNCIAS

1. Capella JF, Capella RF. Gastro-gastric fistulas and marginal ulcers in gastric bypass procedures for weight reduction. *Obes Surg.* 1999;9(1):22-7; discussion 28.
2. Carrodeguas L, Szomstein S, Soto F, Whipple O, Simpfendorfer C, Gonzalvo JP, et al. Management of gastrogastric fistulas after divided Roux-en-Y gastric bypass surgery for morbid obesity: analysis of 1,292 consecutive patients and review of literature. *Surg Obes Relat Dis.* 2005;1(5):467-74.
3. Cho M, Kaidar-Person O, Szomstein S, Rosenthal RJ. Laparoscopic remnant gastrectomy: a novel approach to gastrogastric fistula after Roux-en-Y gastric bypass for morbid obesity. *J Am Coll Surg.* 2007;204(4):617-24.
4. Tucker ON, Szomstein S, Rosenthal RJ. Surgical management of gastro-gastric fistula after divided laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass for morbid obesity. *J Gastrointest Surg.* 2007;11(12):1673-9.



1. Professor Convidado do departamento de Cirurgia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, São Paulo, SP
2. Chefe do Serviço de Radiologia Geral do Hospital Sirio Libânes, São Paulo, SP
3. Chefe do departamento de Cirurgia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, São Paulo, SP