

Atualização em terapia nutricional domiciliar (TND)

WANDERLEY M. BERNARDO E ALESSANDRA BORGES

©2012 Elsevier Editora Ltda. Todos os direitos reservados.

1. Quando a TND está indicada?

- Está contraindicada na doença inflamatória intestinal
- Está indicada em pacientes com queimaduras
- As indicações são diferentes das hospitalares
- Deve ser ministrada concomitante à nutrição enteral

2. São critérios de seleção para aprovação da TND, exceto?

- Luz e refrigeração adequada
- Ambiente domiciliar com condições adequadas
- Familiar ou cuidador intelectualmente capaz
- Visitas periódicas de um farmacêutico

3. Em relação ao custo da TND é verdadeiro:

- Pode ser 2,7 vezes menor do que o custo hospitalar
- Nos casos de acidente vascular cerebral, é semelhante ao hospitalar
- É semelhante ao de casas de repouso
- Apesar de custo inferior ao hospitalar, não reduz o tempo de hospitalização

4. Há interferência da TND na internação?

- Não reduz as reinternações
- A infecção de catéter é a maior causa de hospitalização
- É responsável por cerca de 50% das causas de internação
- Apesar de reduzir o tempo de hospitalização, é a principal causa de reinternações

5. É possível que familiares treinados administrem a TND?

- Nunca deve ser administrada por familiares
- Sim, dispensando o cuidado de profissionais de saúde
- Devem ser treinados antes de o paciente ir para domicílio
- Apesar do treinamento, a tensão gerada pela necessidade do cuidado (por exemplo com a sonda) impede uma atenção apropriada ao paciente.

RESPOSTAS AO CENÁRIO CLÍNICO: ATUALIZAÇÃO EM CARCINOMA ENDOMETRIAL: TRATAMENTO

[PUBLICADO NA RAMB 2012; 58(4)]

- Nesses pacientes em estado inicial não há indicação (**Alternativa D**).
- A radioterapia adjuvante está indicada quando há risco de metástases (**Alternativa C**).
- Não há diferença na sobrevida entre a laparoscopia e laparotomia (**Alternativa A**).
- Não altera a sobrevida (**Alternativa B**).
- Consultas trimestrais nos primeiros três anos (**Alternativa D**).